

Аполипопротеин Б

За тестот:

Мерење на концентрација на Аполипопротеин А1 и Аполипопротеин Б во крвта како дел од проценка на ризик за појава на кардиоваскуларни болести, особено кај лица со хиперлипидеми и семејна историја на кардиоваскуларни заболувања.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Подготовка пред земање примерок:

За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок (на празен стомак) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето крв доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.

За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето крв треба да се прави после прекин со терапијата и wash out периодот (времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности). Ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.

Референтни вредности:

Аполипопротеин А1	1,24 - 2,02	g/L
Аполипопротеин Б	0,43 - 1,40	g/L

Забелешка:

Аполипопротеините се протеинската компонента на липопротеинските комплекси кои ги транспортираат масните во организмот.