

Pyrilinks-D (Deoksipiridinolin DPD)

| | |
|--|---|
| За тестот: | Тест за одредување на нивото на деоксипиридинолин (DPD), познат и како Pyrilinks-D, специфичен маркер за коскената ресорпција и остеокластичната активност. Се користи заедно со другите коскени маркери за дијагностицирање на болести на коските како што се постменопаузална остеопороза, коскени метастази и Paget-ова болест, како и за следење на состојбата и проценка на ризикот и одговорот на терапијата. |
| Примерок: | Урина |
| Подготовка пред земање на примерок: | За преглед на урината неопходно е да се земе, после лична хигиена (тоалета со топла вода и сапун), првата утринска урина (среден млаз) во стерилен сад и во најкраток можен рок да се донесе во лабораторија. Ако не сте во можност да дојдете веднаш, урината може да се држи во фрижидер некое време. Прегледот на примерокот од урина треба да се направи најкасно 2 часа од неговото земање, а максимално 4 часа ако урината се чува во фрижидер. |
| Забелешка: | ДПД или деоксипиридинолинот се формира за време на ензимската акција на лизил оксидазата на аминокиселината лизин. ДПД се ослободува во циркулацијата за време на процесот на ресорпција на коските. ДПД се излучува неметаболизиран во урината и е независен од начинот на исхрана, што го прави погоден за оценување на ресорпцијата. |

* неакредитирани

Лабораторијата е акредитирана согласно
MKS EN ISO 17025:2006



Лабораторијата е под редовна месечна
надворешна контрола на квалитет **EQAS**.