ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
СЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
ЛОКАЦИЈА 1 Бул. 8-ми Септември бр. 2, лок. 1, 1000 Скопје; тел: 02 3179 001; lab@avicenalab.com.mk
ЛОКАЦИЈА 2
Бул. Јане Сандански бр. 7, лок. 4, 1000 Скопје; тел: 02 2477 345; lab2@avicenalab.com.mk
ЛОКАЦИЈА 3
ул. Благоја Тоска бр.222, 1200 Тетово; тел: 044 355 550, 044 355 551; labtetovo@avicenalab.com.mk

Седиментација на еритроцити

За тестот:	Одредување на брзина на таложење на еритроцити под дејство на земјина гравитација. При инфламација, со зголемување на концентрацијата на фибриногенот и другите протеини на акутна фаза, доаѓа до побрзо таложење на еритроцитите, па се добива зголемена седиментација.
Примерок:	Венска или капиларна крв.
Подготовка пред земање примерок:	За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок (на празен стомак) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето крв доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити. За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето крв треба да се прави после прекин со терапијата и wash out периодот (времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности). Ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.
Забелешка:	Реф. вредности: mm/h мажи: <10 / прв час жени: <12 / прв час