

SHBG (sex-hormon binding globulin)

За тестот:	Тест за одредување на нивото на SHBG во крвта, за утврдување на причината за неплодност, намалениот сексуален нагон или еректилната дисфункција кај мажите и дијагноза и следење на жени со симптоми или знаци на андроген вишок.
Примерок:	Венска или капиларна крв.
Подготовка пред земање на примерок:	<p>За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок (на празен stomak) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето на крвта доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.</p> <p>За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето на крвта треба да се врши после прекин со терапијата и wash out периодот (времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности) – ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.</p>
Забелешка:	Секс хормон - врзувачкиот глобулин (SHBG) или секс стероид - врзувачкиот глобулин (SSBG) е гликопротеин кој се врзува со половите хормони, андрогените и естрогените. Така биорасположивоста на половите хормони е под влијание на нивото на SHBG. Се произведува главно во црниот дроб и се ослободува во крвотокот. Нивоата на SHBG се намалуваат од андрогени, анаболни стероиди, полицистичен оваријален синдром, хипотироидизам, дијабетес, Кушингов синдром и акромегалија. Нивоата на SHBG се зголемуваат со естрогенски (орални контрацептиви), бременост, хипертироидизам, цироза на црниот дроб, анорексија и одредени лекови.

* неакредитирани

Лабораторијата е акредитирана согласно
MKS EN ISO 17025:2006



Лабораторијата е под редовна месечна
надворешна контрола на квалитет **EQAS**.