

ОМ-МА (СА 125)

За тестот:	Тест за одредување на серумското ниво на СА 125, биомаркер за откривање на рак на јајници.
Примерок:	Венска или капиларна крв.
Подготовка пред земање на примерок:	<p>За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок (на празен stomak) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето на крвта доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.</p> <p>За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето на крвта треба да се врши после прекин со терапијата и wash out периодот (времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности) – ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.</p>
Забелешка:	<p>Околу 90 % од жените со напреднат рак на јајници имаат покачено ниво на СА - 125 во крвниот серум, правејќи го СА- 125 корисен за откривање на рак на јајниците по почетокот на симптомите. Мониторингот на нивото на СА - 125 во крвниот серум е, исто така, корисен за проценка на одговорот на третманот и за прогнозирање на состојбата на пациентот по третманот. Тумори кои често одат со покачени вредности на СА 125 се: рак на јајници, други гинеколошки тумори, рак на панкреасот и жолчните канали. Останати заболувања кои можат да дадат покачени вредности на СА 125 се: цироза на црн дроб, акутен панкреатитис (воспаление на панкреасот), акутен холециститис (воспаление на жолчното кесе) и други бенигни гинеколошки заболувања или воспаленија.</p>

* неакредитирани

Лабораторијата е акредитирана согласно
MKS EN ISO 17025:2006



Лабораторијата е под редовна месечна
надворешна контрола на квалитет **EQAS**.