

## CA 72-4

<b>За тестот:</b>	Тест за одредување на серумското ниво на CA 72-4, маркер за рак на желудникот и деболото црево. Заедно со CA 125 маркерот, помага во поставувањето на дијагнозата, како и во следењето на епителијални карциноми на јајникот.
<b>Примерок:</b>	Венска или капиларна крв.
<b>Подготовка пред земање на примерок:</b>	За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок ( на празен стомак ) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето на крвта доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити. За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето на крвта треба да се врши после прекин со терапијата и wash out периодот ( времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности ) – ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.
<b>Забелешка:</b>	CA 72-4 е туморски маркер за карцином на желудникот, чија специфичност е поголема од 95%. Вредностите на овој маркер во серумот се совпаѓаат со стадиумот на болеста. Колку е стадиумот на болеста понапреднат, толку и серумските вредности на CA 72-4 се повисоки. Тој помага и при следењето на болеста во текот на терапијата. На тој начин може да се оцени и одговорот на туморот спрема применетата терапија. CA 72-4 има голема важност при првичното поставување на дијагнозата на ракот на јајникот, како и за следење на одговорот на туморот на спроведената терапија. Се користи и како маркер за следење на болеста, по завршувањето на третманот, односно, тој е рутински лабораториски тест за откривање на рецидивот на ракот на јајникот

\* неакредитирани

\* неакредитирани

Лабораторијата е акредитирана согласно  
MKS EN ISO 17025:2006



Лабораторијата е под редовна месечна  
надворешна контрола на квалитет **EQAS**.